

Definitie:	
U bent overgevoelig bevonden voor de bovenvermelde stof. Ter bevordering van uw genezing en om te voorkomen dat het eczeem weer optreedt, ontvangt u hierbij informatie over het gebruik en voorkomen van deze stof zodat u verdachte voorwerpen kunt vermijden. Met nadruk moet worden gezegd dat deze lijst slecht dient als leidraad; het is onmogelijk om alle mogelijkheden aan te geven temeer daar deze steeds kunnen wisselen.	
Wat is neomycine?	
	Neomycine sulfaat is een aminoglycoside antibioticum. Het bestaat uit 78-88 % neomycine B en 10-16% neomycine C. Tijdens de test doen zich heel vaak late reacties voor na de vierde dag. Als u allergisch bent voor neomycine kunt u door andere antibiotica van de aminoglycosiden-groep ook een allergisch contacteczeem krijgen. Bij een allergie voor neomycine reageert u ook altijd allergisch op framycetine, een antibioticum dat sterk lijkt op neomycine.
In welke producten komt neomycine voor?	
	Neomycine en framycetine komen voor in druppels en zalven die door uw arts kunnen worden voorgeschreven. Neomycine kan ook in tablet of capsulevorm of als injectie/infuus worden voorgeschreven: ook hier kunnen allergische reacties op ontstaan als u allergisch bent voor neomycine. Ook in sommige geneesmiddelen voor dieren kan neomycine voorkomen.
Waar treft u neomycine sulfaat aan?	
	Op het werk: <ul style="list-style-type: none"> • Diergeneesmiddelen voor huid, ogen en oren • Antibiotica voor huid, ogen en oren Thuis: <ul style="list-style-type: none"> • Antibiotica crèmes, zalven en lotions • Oogmedicatie en oor medicatie • Dierverzorgingsproducten
Hoe ziet eczeem door neomycine eruit?	
	Op de plekken waar de huid met neomycine in contact is ontstaan rode, jeukende vlekken. Ook kunnen nattende plekken met blaasjes ontstaan. Als u een allergie heeft voor neomycine en u gebruikt oogdruppels waarin neomycine zit, dan kunnen er klachten van een 'zandkorrelgevoel' in de ogen ontstaan en kunnen de ogen rood worden. Ook de oogleden kunnen reageren met roodheid, jeuk en schilfering.
Zijn er andere stoffen die vermeden moeten worden?	
	Als er vastgesteld is dat u allergisch bent voor neomycine is het mogelijk dat u ook reageert op andere antibiotica van de aminoglycosiden-familie. Dit zijn o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Gentamicine • Amikacine • Tobramycine
Apotheek waarschuwen:	
	Als bij u een allergie voor neomycine is vastgesteld is het belangrijk uw apotheek over deze allergie in te lichten. Wanneer in de toekomst per ongeluk een geneesmiddel wordt voorgeschreven waarin een stof zit waar u allergisch op kan reageren, kan de apotheek de voorschrijvend arts waarschuwen.

Neomycine sulfaat		paraaf
Eigenaar: Derma Rijnmond	Geldig per 01.01.2025	Versie 1.02
Autorisatie: mbvl	Vervalt per 31.12.2028	Pagina 1 van 1