

Informatie Allergieën Budesonide

Dok. Nr.: 1.16:

Definitie:	
U bent overgevoelig bevonden voor de bovenvermelde stof. Ter bevordering van uw genezing en om te voorkomen dat het eczeem weer optreedt, ontvangt u hierbij informatie over het gebruik en voorkomen van deze stof zodat u verdachte voorwerpen kunt vermijden. Met nadruk moet worden gezegd dat deze lijst slecht dient als leidraad; het is onmogelijk om alle mogelijkheden aan te geven temeer daar deze steeds kunnen wisselen.	
Wat zijn epoxyharsen?	
	<p>Budesonide behoort tot de groep geneesmiddelen die bijnierschorschormonen of corticosteroïden worden genoemd. Budesonide is een groep B-glucocorticoïde-steroïde voor de behandeling van astma, hooikoorts en andere allergieën, en voor de behandeling en preventie van neuspoliepen. In de neus verstoven budesonide werkt ontstekingsremmend en voorkomt zwelling van het neusslijmvlies. Bovendien wordt het gebruikt voor inflammatoire darmaandoeningen.</p> <p>Bij plakproeven met corticosteroïden treden niet zelden late reacties op. Bij sterke verdenking op een allergie voor corticosteroïden zult u dan ook gevraagd worden om de plakproeven ook na 7 dagen te laten aflezen.</p>
Waar treft u epoxyhars aan?	
	<p>Vermijd producten waarvan de ingrediëntenlijst bestaat uit één of meerdere van de volgende namen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budesonide • CCRIS 5230 • EINECS 257-139-7 • S 1320 • (11-beta,16-alpha)-16,17- (Butylidenebis(oxy))-11,21- dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione • (RS)-11beta,16alpha,17,21- Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20- dione cyclic • 16,17-acetal with butyraldehyde • 16-alpha,17-alpha-Butylidenedioxy-11- beta,21-dihydroxy-1,4-pregnadiene- 3,20-dione • Pregna-1,4-diene-3,20-dione, • 16,17-(butylidenebis(oxy))-11,21-dihydroxy-, (11-beta,16-alpha)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, • 16,17- butylidenebis(oxy)-11,21-dihydroxy-, (11beta,16alpha(R))-, • 16alpha,17-((S)-Butylidenebis(oxy))-11beta,21- dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione • Pregna-1,4-diene-3,20-dione, • 16,17-(butylidenebis(oxy))-11,21-dihydroxy-, (11beta,16alpha)-
Wie heeft een grote kans aan epoxyharsen te worden blootgesteld?	
	<p>Patiënten die positief reageren op budesonide kunnen ook reageren op de groep B corticosteroïden, de 'acetonide'-groep (w.o. amcinonide, triamcinolonacetonide, fluocinolonacetonide, fluocinonide, halcinonide).</p> <p>Ook zijn er kruisreacties mogelijk met enkele uit de groep D corticosteroïden, zoals aclomethasondipropionaat, hydrocortisonbutyraat en bètamethasonvaleraat. Relatief 'veilige' middelen zijn de meesten van de groep C corticosteroïden, zoals desoximetason, dexamethason, fluocortolon en van groep E, mometasonfuoraat. De kans op een allergische reactie is voor deze middelen gering, eveneens is de kans op een kruisreactie gering indien er eerder een allergie op tixocortolpivalaat en budesonide werd aangetoond.</p>
Hoe kan contacteczeem door epoxyharsen zich presenteren?	
	Budesonide wordt gebruikt in medicamenten voor de behandeling van o.a. astma, langdurig ontstoken neusslijmvlies, allergie, hooikoorts, neuspoliepen, longemfyseem en bronchitis.

Budesonide		paraaf
Eigenaar: Derma Rijnmond	Geldig per 01.01.2025	Versie 1.02
Autorisatie: mbvl	Vervalt per 31.12.2028	Pagina 1 van 1